

恵みには、
かかせないもの。



ロブルール[®]

水和剤

作物登録数66の幅広い適応。
環境にもやさしい殺菌剤の決定版。

農林水産省登録:第14212号

●成分:イプロジオン.....50.0% ●毒性:普通物



Bayer CropScience

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数(倍) | 使用時期* | 使用回数* | | 使用 方法 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 本剤 | イプロジオンを含む農業の総使用回数 | |
| かんきつ | 灰色かび病 | 1,000~2,500 | 7日 | 3回 | 3回 | 散 布 |
| | 黄斑病 | 1,000~1,500 | | | | |
| | 黒腐病 | 1,000 | | | | |
| りんご | 斑点落葉病 | 1,000~1,500 | 14日 | 5回 | 5回 | |
| | 黒斑病 | | | | | |
| なし | 黒斑病 | 1,000~1,500 | 前日 | 3回 | 3回 | |
| もも | 灰星病 | | | | | |
| ネクタリン | ホモフシス腐敗病 | 1,000 | 前日 | 3回 | 3回 (600~800倍希釈散布は1回) | |
| おうとう | 灰星病 | 1,000~1,500 | | | | |
| | 黒かび病 | 1,000 | | | | |
| すもも | 灰星病 | 1,000~1,500 | 3日 | 2回 | 3回 | |
| あんず | | | | | | |
| びわ | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | 前日 | 2回 | 2回 | |
| うめ | 灰色かび病、環紋葉枯病 | | | | | |
| キウイフルーツ | 果実軟腐症 | 1,500~2,000 | 前日 | 4回 | 4回 | |
| | 灰色かび病 | | | | | |
| | 貯蔵病害(灰色かび病) | | | | | |
| | 開花期~落花期 | | | | | |
| ぶどう | 灰色かび病、白腐病 | 1,000~1,500 | 開花期~幼果期 ただし60日 | 3回 | 3回 | |
| | 黒とう病 | 500~1,000 | | | | |
| | マンゴー | 1,000 | | | | |
| いちご | 灰色かび病 | 1,500 | 7日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| ピーマン | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | 前日 | | | |
| | 菌核病 | 1,000 | | | | |
| きゅうり | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | 前日 | 3回 | 4回 (種子粉衣1回、は種後3回) | |
| | 菌核病、つる枯病 | 1,000 | | | | |
| かぼちゃ | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | 前日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| トマト | 輪紋病、斑点病 | 1,000 | | | | |
| ミニトマト | 灰色かび病、黒枯病 | 1,000~1,500 | 前日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| なす | 菌核病、すすかび病 | 1,000 | | | | |
| すいか | 菌核病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回 (種子粉衣1回、は種後3回) | |
| メロン | つる枯病 | | | | | |
| キャベツ | 菌核病 | 1,000~1,500 | 14日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| はくさい | 白斑病、黒斑病 | | | | | |
| レタス | 灰色かび病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回 (種子粉衣1回、は種後3回) | |
| | 菌核病、すそ枯病 | | | | | |
| たまねぎ | 灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回 (種子粉衣1回、は種後3回) | |
| ねぎ | ポトリチス葉枯症、黒斑病、 小菌核腐敗病 | 1,000~1,500 | 14日 | | | |
| | 小菌核腐敗病 | 500 | | | | |
| | 白絹病 | 500~1,000 | | | | |
| わけぎ | ポトリチス葉枯症、黒斑病、 小菌核腐敗病 | 1,000~1,500 | 前日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| あさつき | 黒斑病、灰色かび病 | 2,000 | | | | |
| オクラ | 灰色かび病、斑点病 | 1,000~1,500 | 14日 | 4回 | 5回 (種子粉衣1回、は種後4回) | |
| 薬用いんじん | 斑点病 | 1,000~1,500 | | | | |
| いんじん | 黒葉枯病 | 種子重量の0.5% | は種前 | 1回 | 1回 | |
| | 根株養成期 地上部切り 取り前 ただし35日 | 1,000 | 伏込時 ただし30日 | 2回 | 4回 (種子粉衣1回、散布2回、 土壌灌注1回) | |
| みつば (軟化栽培) | 菌核病 | 1,000 | は種前 | 1回 | 4回 (種子粉衣1回、散布2回、 土壌灌注1回) | |
| らっきょう | 灰色かび病 | 125 | 30日 | 3回 | 3回 | |
| ばれいしょ | 菌核病、夏疫病 | | 125 | 前日 | 4回 | 4回(種いも散布1回) |
| | 黒あざ病 | 植付前 | | 1回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | |
| えだまめ | 灰色かび病 | 1,000 | 30日 | 3回 | 3回 | |
| だいず | 菌核病 | | 1,000 | 21日 | 3回 | 3回 |
| あずき | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | | 前日 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| いんげんまめ | 菌核病 | 500~1,000 | | | | |
| 実えんどう | 灰色かび病 | 1,000 | 21日 | 3回 | 3回 | |
| らっかせい | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | | | | |
| はとむぎ | 葉枯病 | 1,000 | 21日 | 3回 | 3回 | |
| てんさい | 葉腐病 | 500~1,000 | | | | |
| 畑わさび | 墨入病 | 1,000(定植時) および 500(定植後) | 定植時および 定植後 ただし30日 | 4回 (苗浸漬1回、 定植後3回) | 5回 (種子粉衣1回、苗浸漬1回、 定植後3回) | 定植時に20時間苗浸漬し、 さらに定植後1m ² 当り3ℓ灌注する |
| たばこ | 菌核病 | 1,500~2,000 | 大土寄せ時 | 1回 | 1回 | 1株当り200ml株元灌注 |
| 茶 | 灰色かび病 | 1,000~1,500 | 21日 | 2回 | 2回 | 散 布 |
| 苺 | 葉腐病(ブラウナリッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病 | | 1,000~1,500 | 発病初期 | 8回 | 8回 |
| 苺(日本苺) | 葉腐病(ラーシラリッチ) | | | | | |
| 苺(ベントグラス) | ダラスボット病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| スターチス | 灰色かび病 | | | | | |
| あしたば | 葉枯病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| うど | 黒斑病 | | | | | |
| さやえんどう | 黒斑病 | 1,500 | 根株養成期(ただし50日) 伏込時(ただし21日) | 1回 | 4回 (散布3回、土壌灌注1回) | 1m ² 当り6ℓ 土壌灌注 |
| | 菌核病 | | | | | |
| 食用ゆり | 灰色かび病 | 1,000 | 前日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| 葉たまねぎ | 葉枯病 | | | | | |
| ひろしまな | 灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 3回 | |
| 未成熟さざげ | 白斑病 | | | | | |
| 未成熟そらまめ | 灰色かび病 | 1,500 | 前日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後2回) | 散 布 |
| くきちしゃ | 赤色斑点病 | | | | | |
| 葉ごぼう | 灰色かび病 | 1,000 | 7日 | 3回 | 4回 (種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| | 菌核病、すそ枯病 | | | | | |
| ごぼう | 灰色かび病 | 1,000 | 30日 | 2回 | 3回(種子粉衣1回、は種後2回) | 散 布 |
| のざわな | 菌核病 | | | | | |
| 食用菜(果実) | 灰色かび病 | 1,000 | 35日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| | 野菜類、花き類 | | | | | |
| パジル | アルタナリア菌による病害 | 種子重量の0.5% | は種前 | 1回 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 |
| りんどう | 菌核病 | 2,000 | 14日 | 3回 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | 散 布 |
| | 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 500 | は種前 | 1回 | 2回 | 48時間種子浸漬 |
| | | 1,000 | 本葉展開直後~定植前 | 2回 | (種子浸漬1回) | 散 布 |

| 適用場所 | 作物名 | 適用病害名 | 10アール当り使用量 | | 使用時期* | 使用回数* | | 使用方法 |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------------|------------------|-------|-------------------|------|
| | | | 薬量(g) | 使用液量(ℓ) | | 本剤 | イプロジオンを含む農業の総使用回数 | |
| 温室、ガラス室、 ビニールハウスなどの 密閉できる場所 | きゅうり | 灰色かび病 | 200 | 5 | 前日 | 4回 | 5回(種子粉衣1回、は種後4回) | 常温煙霧 |
| | トマト | | | | | 3回 | 3回 | |
| | ミニトマト | | | | | | | |
| | ぶどう | | | 開花期~幼果期 ただし60日 | 4回(種子粉衣1回、は種後3回) | | | |

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベル記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

(F-2069 08.12.JWT)

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室: ☎ 0120-575-078 (9:00~12:00, 13:00~17:00) 土・日・祝祭日をのぞく