



りんご・なし・ぶどう・
きゅうりの浸透移行性
混合殺菌剤

アリエツティC[®]
水和剤



Bayer CropScience

アリエッティC[®]水和剤

●浸透性殺菌剤ホセチルと保護殺菌剤キャプタンが、二段構えの相乗効果を発揮します。

●ホセチルは直接的な殺菌作用と、間接的な抵抗性誘導作用により効果を発揮します。

●キャプタンは病原菌に含まれる酵素を多岐に渡り阻害し、効果を発揮します。

●作物の自己防衛反応を強化するホセチルの抵抗性誘導作用と作用点が多岐にわたるキャプタンの混合剤なので、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期*	使用回数*			使用方法
				本剤	キャプタン	ホセチル	
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 すす点病 すす斑病 炭疽病 褐斑病	800	14日	3回	6回	3回	散布
なし	黒斑病 輪紋病	400~800			9回		
ぶどう	晩腐病 べと病 黒とう病	400~600	45日	2回	2回		
きゅうり	べと病	400~800	前日	3回	5回 (種子粉衣は1回)		

を交換してください。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

し、うがいをするとともに衣服

- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
- 夏期高温時の使用を避けてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがありますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。