


広範囲の害虫に すばやい効果!

農林水産省登録
第18270号




トレボン® EW

エトフェンプロックス……10.0%

ヒメトビウンカ



アカヒゲミドリカスミカメ



クモヘリカメムシ




アブラムシ類



イネドロオイムシ



オンシツコナジラミ



マメシクイガ



アオムシ



ヨトウムシ



特長

- 水をベースに作られたトレボンの製剤です。
- 多くの作物に使用でき、広範囲の害虫に有効です。
- 速効的なノックダウン効果と効果の持続性を備えています。
- 散布時の臭いがなく、施設内でも使いやすい薬剤です。

®:三井化学(株)登録商標



Bayer CropScience

広範囲の害虫に すばやい効果!



■魚毒性：原体B類相当 ■毒性区分：普通物

■適用害虫の範囲と使用方法

作物名 適用場所	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤およびエトフェンプロックス を含む農薬の総使用回数	使用方法			
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ	1,000	収穫21日前まで	3回以内	散布			
	なきゅうり		収穫前日まで					
	すいか		収穫3日前まで					
	メロン		アブラムシ類			収穫14日前まで	4回以内	
	ばれいしょ					アブラムシ類		収穫21日前まで
	レタス							収穫3日前まで
	やまのいも		収穫7日前まで					
	だいこん		アブラムシ類			収穫21日前まで	3回以内	
	キャベツ		ヨトウムシ			収穫3日前まで		
	はくさい		アオムシ			収穫7日前まで		
	てんさい		ヨトウムシ			収穫14日前まで	2回以内	
	ねぎ		シロイチモジヨトウ			収穫21日前まで		
だいず	マメシンクイガ	収穫14日前まで						
えだまめ	ハスモンヨトウ	収穫21日前まで	2回以内					
トマト	タバココナジラミ	収穫日前まで						
さやえんどう	ウラナミシジミ							
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ		6回以内					
きく	アブラムシ類	5回以内						
つつじ	ツツジグンバイ	6回以内						
まき	モンアシブトゾウムシ	4回以内						
つばき	チャドクガ	4回以内						
さくら	アメリカシロヒトリ マイマイガ モンクロシャチホコ	2,000	—	6回以内				
ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソウ等 の多年生雑草が優占して いる休耕田	カメムシ類	1,000	—	3回以内				

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 散布液量	使用時期	本剤およびエトフェンプロックス を含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	300	25ℓ	収穫21日前まで	3回以内	散布

■上手な使い方

- 害虫の発生初期に、薬液が直接虫体につくように、ていねいに散布してください。
- 作物の茎葉が繁茂している場合には、散布水量を増やして散布してください。

⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用前には、容器をよく振ってください。
- 所定量の水を加えよくかきまぜ溶液にして散布してください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若齢幼虫期に散布してください。(効果)
- 本剤を水田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤飲の場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(刺激性)
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

- 畜に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 散布器具、作業衣などは、養用と必ず区別してください。
- 散布に際してはミツバチおよび巣箱に絶対にかからないようにしてください。露地では2日、ハウス内では4日間放飼をさせてください。ハウス内では訪花忌避が約2週間続きます。
- 水産動物に影響を及ぼすので、養魚田などでの使用はさけてください。
- 甲殻類および冷水魚に特に影響を及ぼすおそれがあるので、養殖池などの周辺での使用はさけてください。比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので十分注意してください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 空容器は圃場等に放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

⚠ 保管上の注意

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

バイエルクロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262
www.bayercropscience.co.jp

F-1108/07.08NY 印刷:平成19年8月