

シクロパックの散布タイミングは、ここ！
勝負どころをしっかりとらえましょう。



ポイッ!

ポイッ!



アゼからポイッ! 適期にポイッ!



イネミズゾウムシ、イネゾウムシ、イネドロオイムシ、
イナゴ類、イグサシムシガの防除に

シクロパック® 粒剤



有効成分:シクロプロトリン…5.0% 毒性区分:普通物 魚毒性:原体B類相当

アゼからポイツ! のカンタン防除。

軽さ実感の60gパック。
10アール当りの処理量はわずか600gです。



適用と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
稲	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ イネゾウムシ イナゴ類	小包装(パック) 10個(600g)	収穫 60日前 まで	4回 以内	水田に小包装 (パック)の まま投げ入れる
いぐさ	イグサシンムシガ		生育期		

*本剤及びシクロプロトリンを含む農薬の総使用回数



1アールにつきパック1個の割合でアゼから田面に、下手投げの要領で軽く投げ入れてください。田んぼの大きさに合わせて必要個数を水田全体に投げ入れます。



使用上の注意

- ① シクロパック粒剤は、やや深水の湛水状態(湛水深約3~5cm)で散布し、散布後少なくとも3~4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また落水、かけ流しはしないでください(効果)。
- ② 藻や浮草が多発している水田では拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるため使用をさけてください(効果)。
- ③ パックは水溶性フィルムのため、濡れた手で散布作業をしたり、降雨などで破袋しないよう注意してください。
- ④ イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広いので、なるべく広範囲で一斉に防除してください(効果)。
- ⑤ 水稲での本剤の使用時期は、イネミズゾウムシ、イネドロオウムシの各成虫の本田侵入盛期です(効果)。
- ⑥ 各成虫の本田侵入盛期が接近している場合は、同時防除もできますが使用の際には、病害虫防除所や普及センターなど農業技術者に散布時期の指導を受けてください。
- ⑦ いぐさに使用する場合、いぐさが繁茂する前までに使用してください。
- ⑧ 投げ入れた薬剤が株元に落ちた場合、葉枯れが生じることがありますが、その周囲の株には影響はほとんどありません(葉害)。



安全使用上の注意

小包装(パック)が破袋した場合の注意

- ① 眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けてください(刺激性)。
- ② かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。



魚毒性

- ① 水産動物に影響を及ぼすので、養魚田での使用をさけてください。
- ② 甲殻類に特に影響を及ぼすおそれがあるので、養殖池周辺での使用はさけてください。
- ③ 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



貯蔵上の注意

- ① 密封して直射日光をさけ、食品と区別して、下積みにならない冷涼で乾燥した場所に保管してください。
- ② 吸水性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管してください。

●この印刷物は平成16年11月現在の登録内容に準拠して作成いたしました。

●使用前にラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

バイエルクロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262
www.bayercropscience.co.jp