



MR.ジョーカー®

カメムシと
中・後期害虫

全部まとめて、かかってきなさい。



セジロウソウ

ヒモヒソウソウ

アカスジカスミカメ



水稲害虫の総合防除に MR.ジョーカー® 粉剤DL EW



特長

- 幅広い殺虫力** 各種カメムシ類をはじめ、水稲の中・後期の主要害虫を、全部まとめて防除します。
※アカヒゲホソドリカスミカメに対しては遅効的ですが、吸汁阻害効果等により斑点米の発生を抑えます。
- ねばり強い効果** 優れた速効性と残効性があり、散布適期幅が広いので、使いやすい薬剤です。
- 普通物、A類(原体)** (ただし甲殻類に影響を及ぼす恐れがあるので注意)

■適用害虫および使用方法 (2009年1月現在の登録内容)

MR.ジョーカー粉剤DL シラフルオフェン：0.5%

作物名 ()は適用場所	適用害虫名	10アール当 たり使用量	使用 時期	総使用 回数*	使用 方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 コブノメイガ	3~4kg	収穫 7日前 まで	2回以内	散布
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ成虫 フタオビコヤガ	3kg			
	イネツトムシ イネアザミウマ				
だいず えだまめ	カメムシ類	4kg		3回以内	
かんしょ	ナカジロシタバ				
水田作物、 畑作物 (休耕田)*	カメムシ類	3~4kg	—	2回以内	

MR.ジョーカーEW シラフルオフェン：19.0%

作物名 ()は適用場所	適用害虫名	希 釈 倍 数	10アール当 たり使用液量	使用 時期	総使用 回数*	使用 方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 コブノメイガ フタオビコヤガ	2000倍	60~ 150ℓ	収穫 14日前 まで	2回 以内	散布
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	500倍	25ℓ			
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	16倍	0.8ℓ			無人ヘリコ プターによ る散布
だいず	カメムシ類 ハスモンヨトウ					
じゅんさい (じゅんさい田)	ジュンサイハムシ マダラミスメイガ			前日		散布
水田作物、 畑作物 (休耕田)*	カメムシ類	2000倍	60~150ℓ	—		

*ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田。

*印は本剤およびシラフルオフェンを含む農薬の総使用回数。

粉剤DL散布の際は、散布機の開度を一般粉剤より一目盛程度しぼってください。

■注意事項

【粉剤DL・EW共通】



●ミツバチに毒性があるので、ミツバチおよび巣箱にかからないように十分注意して下さい。



●蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないように注意して下さい。



●水産動物、特に甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、養殖池等周辺での使用はさけて下さい。

【粉剤DL】



●散布の際は農薬用マスクなどを着用して下さい。作業後はうがいをして下さい。

【EW】

- 使用前によく振ってから使用して下さい。
- あぶらな科作物、レタスおよび展葉期から落花期のなしにかからないように十分注意して散布して下さい。
- 希釈倍数500倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型(速度運動式)地上液剤少量散布装置を使用して下さい。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。

●ラベルの記載以外には使用しないでください。

●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室： ☎ 0120-575-078 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日をのぞく)