



パスワード®

顆粒水和剤

フレッシュな結実へ!

- 果樹の灰色かび病及び灰星病に有効な薬剤です。
- 既存の薬剤耐性菌に対しても高い効果を示します。
- 優れた予防効果と長い残効性を有する薬剤です。
- 安全性が高く、顆粒水和剤なので使用者にとっても使い易い薬剤です。

灰色かび病、
灰星病専用剤



Bayer CropScience


■適用病害および使用方法

(2008年2月現在の登録)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当たり使用液量(ℓ)	使用時期*	本剤およびフェンヘキサミドを含む農薬の総使用回数*	使用方法
おうとう	幼果菌核病	1,000	200~700	前日	2回	散布
すもももも	灰星病	1,000~1,500		14日		
ぶどうかんきつ	灰色かび病		100~300	7日	3回	
いんげんまめあずき						

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■試験成績



■注意事項

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。
- おうとうに使用するには、着色期以降の散布では、果実に汚れを生じる恐れがあるので注意して下さい。
- ぶどうに使用するには、スチューベン・パッファロー・ニューヨークマスカット・ポートランド・ヒムロッドなど一部の品種で、新展開葉に葉害を生じる恐れがあるので注意して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

F-2031/08.03 NY 印刷：平成20年3月

バイエルクロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262
www.bayercropscience.co.jp