




# オンリーワン<sup>®</sup> フロアブル

ものを言うこの一本

茶・落葉果樹の  
主要病害に  
高い効果を発揮します！



## ● 特長

- ①幅広い殺菌スペクトラムを有しています。
- ②散布適期幅の広い薬剤です。
- ③エルゴステロールの生合成を阻害する薬剤です。
- ④環境に対する影響の少ない薬剤です。

## ● 適用病害および使用方法

(2008年8月現在の登録)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期*	総使用回数*	使用方法
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病	2,000	200~700	14日	3回	散布
	黒星病	2,000~4,000				
もも ネクタリン	灰星病 ホモブシス腐敗病 黒星病	2,000		前日		
すもも あんず	灰星病					
おうとう	灰星病 炭疽病 黒斑病					
なし	黒星病	2,000~4,000		前日		
	輪紋病 黒斑病 うどんこ病 赤星病	2,000				
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	2,000~3,000		14日		
	灰色かび病	2,000		前日		
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病			2,000		
ねぎ	さび病 黒斑病	1,000	14日			
わけぎ あさつき	さび病		前日			
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病					
しそ	さび病	4,000	21日	2回		
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2,000~3,000	200~400	7日	1回	
	新梢枯死症 網もち病	2,000				

\*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## 注意事項

- 本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- りんごのモニリア病に対して使用する場合は、葉腐れの初期病斑発現直後に散布して、実腐れの発生を予防する目的で使用して下さい。
- 本剤は茶の新梢枯死症に対して、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発が予想される場合には、効果が劣る場合がありますので注意して下さい。
- はくさい、だいこんに対して薬害を生ずる恐れがありますので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

F-2034/08.08 N Y 印刷:平成20年8月

## バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室: ☎ 0120-575-078 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日をのぞく)