



# ダニエモン<sup>®</sup> フロアブル

# ダニより つよい ダニエモン



- 全く新しい系統の殺ダニ剤で、作用性も異なるので、かんきつの抵抗性ハダニにも高い効果があります。
- ミカンハダニ、ミカンサビダニの全てのステージに対して安定した効果を示し、長期間密度を抑制します。
- 耐雨性に優れます。
- 天敵、有用昆虫に影響が少なく、環境に優しく使いやすい薬剤です。
- 人畜、水産動物、作物に対して高い安全性。

®はバイエルグループの登録商標


ダニに  
エエもんあります。



ミカンハダニ



ミカンサビダニ




チャノホコリダニ



Bayer CropScience

## 上手な使い方

## ミカンハダニ、ミカンサビダニの発生とダニエモンフロアブルの散布適期



## 適用害虫および使用方法


(2008年7月現在の登録)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	総使用回数*	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	4,000~6,000	200~700	7日	1回	散布
	サビダニ類 (ミカンサビダニを除く) チャノホコリダニ	4,000				
びわ	ビワサビダニ					

\*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す。


## 試験成績

### ミカンハダニに対する効果



品 種：宮内伊予柑18年生 害虫発生状況：中発生 処理月日：6月15日  
散布量：約12ℓ/樹  
調 査：散布前、散布3、10、19、31、41日後に雌成虫数を調査

### ミカンサビダニに対する効果



品 種：普通温州23年生 害虫発生状況：極少~多発生 処理月日：6月30日に十分量を散布  
調 査：10月23日に各区100果について被害度別被害率を求めた。  
考 察：防除効果は対照のB水和剤よりも高く、葉害も認められなかったことから6月下旬1回散布における本剤の実用性は高いと思われる。

## 注意事項

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器を良く振って下さい。
- かぶれやすい体質の人は、取り扱いに十分注意して下さい。

## 他剤との混用事例

ダニエモンフロアブルは下記薬剤との混用で薬害事例は認められませんでした。

殺虫剤混用	殺菌剤混用	3種混用	
DDVP乳剤 アドマイヤー顆粒水和剤 アドマイヤーフロアブル アブロード水和剤 エルサン乳剤 オリオン水和剤 オルトラン水和剤 カスケード乳剤 カルホス乳剤 コテツフロアブル	ジメトエート乳剤 スプラサイド乳剤 ダズバン乳剤 テルスター水和剤 トクチオン乳剤 ノーモルト乳剤 ベストガード水溶剤 マブリックEW モスピラン水溶剤 ロディー乳剤		ジマンダイセン水和剤 アドマイヤーフロアブル
	Zボルドー アグリマイシン 100 アグレプト 25水和剤 アリエッティ水和剤 エムダイファー水和剤 ゲッター水和剤 コサイドDF コサイドボルドー ジマンダイセン水和剤 ストロビードライフロアブル		ジマンダイセン水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤
			ジマンダイセン水和剤 スプラサイド乳剤

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。