



# キラップバリアード® フロアブル

きらめきを守る！

ダブルで  
守る

- 異なる作用性の2成分混合殺虫剤で、幅広い害虫に効果があります。
- 即効的に効き、長い残効性を示します。
- 感受性の低下したスリップスに特に効果が高い薬剤です。
- クワシロカイガラムシの天敵蜂(チビトビコバチ)に影響が少ない薬剤です。



新発売!!



天敵蜂(チビトビコバチ)に影響が少ない薬剤です!



チャノキイロアザミウマ



チャノミドリヒメコバチ



チャノホソガ



## 特長

- 異なる作用性の2成分混合殺虫剤で、幅広い害虫に効果があります。新芽害虫であるスリップス、ヨコバイ、チャノホソガに対して、高い防除効果を示します。
- 2成分ともに昆虫神経の異なる部位に作用し、速効的に効果を発現します。また、長い残効性を示します。
- 薬剤感受性の低下したスリップス(チャノキイロアザミウマ)に特に高い効果を示します。
- クワシロカイガラムシの天敵蜂チビトビコバチに影響が少ない薬剤なので、天敵保護を生かした防除体系にも使用できます。



## 適用害虫および使用方法

(2008年4月現在の登録)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	総使用回数*	使用方法
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ コミカンアブラムシ ツマグロアオカスミカメ	2,000	200~400	7日前まで	1回	散布

\*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる摘採前の日数と、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## 試験成績



## 使用上の注意事項

- 本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にかからないようにして下さい。
- ミツバチに影響がありますので、巣箱およびその周辺にかからないようにして下さい。また、養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意するなど、ミツバチの危害防止に努めて下さい。
- 散布器具、容器等の洗浄水は河川等に流さず、空容器は圃場などに放置せず適切に処理して下さい。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔など石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。